

# 平成29年度 馬鈴しょ特別栽培栽培防除体系

項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月								
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中							
作況平年値				始5/6 期5/14 終5/23			6/2			6/18 6/30			8/12			始8/30 期9/16 終10/4											
生育期節農作業	出庫	種子消毒			耕起・整地			中耕			半培土 本培土			茎葉黄変期 茎葉枯凋期			茎葉処理			収穫							
黒あざ病・そうか病 疫病 軟腐病 アブラムシ類	●									○ ● ● ● ●			○ ● ● ● ●			○ ● ● ● ●			各薬剤が使用できる回数								
●は基幹防除 ○は臨機防除 臨機防除は天候の状況や発生状況に応じて散布する	銅 モ ス ン ト+カ マ ッ イ ト			<div style="border: 2px dashed black; padding: 5px;">                     疫病の防除は、ほ場の予察、予察システムの活用で初発後速やかに防除する。                      70%サイド 初回の防除以降10日間隔で！                      (グリーンハッパ → 7日後に70%サイド SC                      → 10日後にラマノ → 10日後に70%サイド SC                      → 10日後にラマノ)                 </div>						ベグ ン リ コ ゼ ン ブ ン		イフ ド ロ ン Cサ		ラ ン マ ン Cサ		イフ ド ロ ン Cサ		ラ ン マ ン Cサ		K B W							
	モンカット 200倍 銅ストマイ 100倍									400倍		1500倍		1500倍		1500倍		1500倍		400倍							
薬剤の使用例										3コ 0サ 0イ 0ド		スタ ー ナ		ボカ ルス ドミ ン		マア イグ シ ン リ											
										1000倍		1000倍		800倍		1000倍											
										ゼ ン タ ー リ		アゲ ウ ツ ト		ゼ ン タ ー リ		ウ ラ ラ D F											
										1000倍		3000倍		1000倍		4000倍											
除草剤散布 植物生長調整剤散布				○												●											
●は基幹防除 ○は臨機防除																処 チ ヨ ッ パ 理											
				セ ン コ ル																							
				100g																							
備考 (耕種防除) (注意事項)	○健全な種芋を使用し、そうか病やウイルス病の発生を抑える。			○ナス科作物以外の作物を4年以上作付けをしていないほ場で栽培する。(輪作体系の確立。)			○未熟有機物の施用をしない。(そうか病や黒あざ病の発生増加につながるため。)			○高pHほ場での作付けは行わない。(そうか病が発生しやすくなるため。)			○排水性の良いほ場で栽培をする。(塊茎腐敗や粉状そうか病の発生を抑えるため。)														

※使用基準(使用時期)を遵守し、使用農薬は体系の範囲内の農薬および回数です。(病害虫の発生が無く、薬剤を省略することはかまいません。)

※使用する順番の入れ替えは可能です。

成分P	回数	カウント	
モンカット	1P	1回	1P
銅ストマイ	0P	1回	0P
グリーンペンコゼブ	1P	1回	1P
フロンサイドSC	1P	2回	2P
ランマン	1P	2回	2P
KBW	0P	1回	0P
コサイド3000	0P	1回	0P
スターナ	1P	1回	1P
カスミンポルドー	0P	1回	0P
アグリマイシン	0P	1回	0P
ゲットアウト	1P	1回	1P
ゼンターリ	0P	2回	0P
ウララDF	1P	1回	1P
センコル	1P	1回	1P
合計P			10P